

Физико-математические науки

УДК 514.1

**Калашникова Лариса Евгеньевна**

*кандидат биологических наук,*

*доцент кафедры биомедицинской инженерии*

*Национальный технический университет Украины*

*«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»*

**Kalashnikova Larysa**

*PhD in Biology, Assistant Professor of the*

*Department of Biomedical Engineering*

*National Technical University of Ukraine*

*«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»*

**Лысак Кристина Евгеньевна**

*художник*

*Национальный драматический театр имени Леси Украинки*

**Lysak Kristina**

*Artist*

*Lesya Ukrainka Natsional Dramatic Theater*

**Рыльцев Евгений Владимирович**

*доктор физико-математических наук,*

*профессор кафедры графического дизайна*

*Межрегиональная академия управления персоналом*

**Ryltcev Evgehiy**

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences,*

*Professor of the Department of Graphic Design*

*Interregional Academy of Personnel Management*

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОГО  
ОРТОГОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

## MATHEMATICAL SUPPORT OF AXONOMETRIC ORTHOGONAL PROJECTION

*Аннотация.* Проведен анализ эволюции прямоугольного координатного тригранника ортогональной аксонометрической изометрии в его различные формы, соответствующие ортогональной диметрии. Это позволило в наглядной форме наблюдать динамику изменения коэффициентов искажения по координатным осям при аксонометрическом проецировании.

*Ключевые слова:* аксонометрия, ортогональность, проецирование.

*Summary.* The analysis of the evolution of a rectangular trihedron orthogonal axonometric isometric view in its various forms, corresponding to the orthogonal diameters. This enabled to observe the dynamics of change in distortion factor of the coordinate axes in the axonometric projection.

*Key words:* axonometry, orthogonal, projection.

Освоение учебной дисциплины "ортогональная аксонометрия" осложняется тем, что её исходные посыпки подаются, чаще всего, в декларативной форме или, в лучшем случае, со ссылкой на труднодоступные источники [1-5]. Настоящим мы постарались исправить сложившуюся ситуацию, базируясь исключительно на правилах элементарной геометрии с тригонометрией [6; 7].

Как известно, аксонометрия - это набор способов отображения на плоскости (в двумерном пространстве) какого-либо природного тримерного объекта. Его положение в пространстве и его размеры определяются системой декартовых координат. При этом плоскость аксонометрической проекции "сечёт", в общем случае, прямоугольный координатный тригранник произвольно, что выражается в соотношении длин его координатных осей:  $OZ \neq OY \neq OX$  (рис.1). В результате образовавшийся треугольник следов –  $\Delta ZYX$  [1-5] может принимать произвольную форму. То

есть, его стороны могут быть связаны неравенством –  $ZY \neq ZX \neq YX$ . Это вид проекции – аксонометрическая триметрия. Единственным ограничивающим условием в случае ортогональной аксонометрии является направление отрезка  $OO_1$  – перпендикуляра из начала координат  $O$  на аксонометрическую плоскость проекции  $ZYX$  в точку  $O_1$  – ортоцентр [6; 7] треугольника  $ZXY$ , чем и задаётся направление проецирующих лучей в данном виде аксонометрического отображения.

Из рис.1 следует, что, поскольку плоскости  $ZOR, YOQ, XOP$  проведены так, что они перпендикулярны плоскости  $ZYX$ , то именно углы  $OZR, OYQ$  и  $OXP$  определяют коэффициенты искажений ( $K$ ) по координатным осям  $OZ, OY, OX$ . То есть,  $K_z = \cos \alpha, K_x = \cos \alpha_1, K_y = \cos \alpha_2$ . Но так как углы  $\alpha, \alpha_1$  и  $\alpha_2$  не одинаковы, то  $K_z \neq K_y \neq K_x$ . Именно этот факт соответствует триметрической аксонометрии. Справедливым остаётся и обобщающее уравнение  $K_x^2 + K_y^2 + K_z^2 = 2$  [1–5].

Чтобы выявить в этом случае некоторые количественные угловые соотношения рассмотрим  $\Delta ZOR$ , образованный в результате сечения координатного тригранника плоскостью проходящей через координатную ось  $OZ$  и перпендикуляр  $OO_1$  к аксонометрической плоскости проекций  $ZYX$ .





Рис. 1. Ортогональная триметрическая аксонометрия [ $\cos^2 \alpha_i = (n/m)_{z,y,x}$ ]

Названный треугольник состоит из двух других треугольников –  $\Delta OZO_1$ ,  $\Delta ORO_1$ , что можно выразить так:  $\Delta ZOR = \Delta OZO_1 + \Delta ORO_1$ . Поскольку соответствующие углы обозначенных треугольников взаимно равны (рис.1), то это значит, что  $\Delta ZOR \sim \Delta OZO_1 \sim \Delta ORO_1$ . Тогда можно записать:  $(O_1Z)/(OZ) = (OZ)/(ZR)$ . То есть,  $(OZ)^2 = (O_1Z) \cdot (ZR)$ . Если принять, что  $(O_1Z)/(ZR) = n/m$  (назовём эту пропорцию "высотной"), то  $(OZ)^2 = (n/m) \cdot (ZR) \cdot (ZR)$  или же  $(OZ)^2/(ZR)^2 = n/m$ . Но  $(OZ)/(ZR) = \cos\alpha$ . Значит  $\cos^2\alpha = n/m = K_z^2$ . Величины  $K_y$  и  $K_x$  можно получить аналогичным путём, рассматривая треугольники  $\Delta YOQ$  и  $\Delta XOP$ . Тогда значения  $K_{z,x,y} = \cos(\alpha; \alpha_1; \alpha_2) = [(n/m)_{z,x,y}]^{1/2}$  при условии их взаимного неравенства.

В случае изометрической аксонометрии её исходным параметрическим соотношением служит равенство:  $a = b = c$  (рис.2). Отсюда следует, что  $ZY = YX = XZ$ . То есть, треугольник  $\Delta ZYX$  – равносторонний треугольник. Известно [6; 7], что в таком треугольнике точка  $O_1$  делит его высоты (биссектрисы, медианы) в отношении  $(ZO_1) / (ZR) = (YO_1) / (YQ) = (XO_1) / (XP) = n/m = 2/3$ . Если учесть, что  $\angle\alpha = \angle\alpha_1 = \angle\alpha_2$  (это очевидно из рис.2), и соответственно  $K_z = K_y = K_x = K_{z,y,x}$ , то  $K_{z,y,x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{1/2} \approx 0,82$ . Тогда  $\angle\alpha_i \approx 35^\circ$ ,  $\angle\beta_i \approx 55^\circ$  при условии, что  $\angle\alpha_i + \angle\beta_i = 90^\circ$ .



**Рис. 2. Ортогональная изометрическая аксонометрия [ $\cos^2 \alpha = (n/m)_{z,y,x} = 2/3$ ]**

Угловые соотношения аксонометрической диметрии [здесь  $\angle \alpha \neq (\angle \alpha_1 = \angle \alpha_2)$ ] удобно рассматривать в процессе эволюции "изометрического" координатного тригранника (рис.2). Такую эволюцию можно представить в двух вариантах. Один из них (рис.3) предполагает, что "высотная пропорция" –  $(n/m)_z$  варьирует следующим образом:  $2/3 \leq (n/m)_z \rightarrow 1$ . Тогда углы  $\alpha$  и  $\beta$  в прямоугольном триграннике изменяются в интервалах соответственно  $[\sim 35^\circ; 0^\circ]$  и  $[\sim 55^\circ; 90^\circ]$ .

Другой вариант эволюции изометрического координатного тригранника реализуется (рис.4) в случае, при котором "высотная пропорция" стремится к 0 от своего "изометрического" значения, то есть,  $0 \leftarrow (n/m)_z \leq 2/3$ . А для углов  $\alpha$  и  $\beta$  интервалами изменений являются соответственно интервалы –  $(90^\circ; \sim 35^\circ]$  и  $(0^\circ; \sim 55^\circ]$ .

Первый вариант эволюции изометрического координатного тригранника может быть реализован двумя способами. Один из них – это, когда точка  $Z \rightarrow \infty$ . Тогда сторона тригранника  $a = OZ \rightarrow \infty$ , стороны  $b = c$  и  $XY$  остаются неизменными, отрезок  $OO_1 \rightarrow OR = \text{const}$ , координатная ось  $OZ$  стремится к параллельности со следом  $ZR$  плоскости  $ZOR$  и, наконец, когда стороны  $XZ, YZ$  и  $OZ$  становятся взаимно параллельными.

Второй способ реализации того же варианта эволюции изометрического тригранника (рис.2) возможен, если  $(b = c) \rightarrow 0$





изометрии, представленного на рис.2. Действительно, если принять во внимание, что изменение коэффициентов искажений  $K_{z,y,x}$  во всём своём диапазоне развивается за четверть периода ( $0^\circ < \angle \alpha < 90^\circ$ ) косинусоидальной гармоники при  $0 < (n/m)_z < 1$ , то из «эволюционного анализа» с отчётливостью следует, что от 0 до 1 изменяется при этом лишь коэффициент  $K_z$ , тогда как коэффициенты  $K_y = K_x$  изменяются в интервале  $(1; 0,71)$ . В самом деле, если  $0 < \angle \alpha_{1,2} \approx 35^\circ$  и  $90^\circ > \angle \alpha \approx 35^\circ$  при  $0 < (n/m)_z \leq 2/3$ , то  $1 > (K_y = K_x) \approx 0,82$  (рис.4). В случае же  $35^\circ \approx \angle \alpha_{1,2} < 45^\circ$  при  $35^\circ \approx \angle \alpha > 0^\circ$  и  $2/3 \leq (n/m)_z < 1$  имеем  $0,82 \approx (K_y = K_x) > 0,71$  (рис.3).

Представленные выше аналитические выражения угловых взаимозависимостей аксонометрии могут быть записаны и через параметр "n/m", а именно:  $\cos \alpha = [(n/m)_z]^{1/2} = K_z$  и  $\cos \alpha_{1,2} = \{[2 - (n/m)_z]/2\}^{1/2} = (K_x = K_y)$ . Удобство такой формы записи заключается в том, что для практического использования угловые измерения заменены здесь более простыми линейными измерениями длин отрезков ("n" или "m") соответствующих высот треугольника следов  $\Delta ZXY$ , определяемых положением его ортоцентра  $O_1$ . С помощью параметра n/m можно также однозначно определить и углы между аксонометрическими осями координат (рис.2-4). Для этого исходными параметрами могут быть произвольно выбранные высота  $ZR (= m_z)$  ( $XP = m_x$  или  $YQ = m_y$  – рис.2) треугольника следов и положение на ней ортоцентра  $O_1$ . Тогда сам  $\Delta ZXY$  строится по трём точкам: одна из них – его вершина Z (X или Y – рис.2), а две другие – это концы его стороны  $(XY) = 2m_z \cdot [1 - (n/m)_z]^{1/2}$ . В полученном таким образом  $\Delta ZXY$  (рис. 2–4) углы всех "категорий" автоматически принимают значения, соответствующие заданным параметрам рассмотренных выше способов аксонометрического проецирования.

При аксонометрической триметрии коэффициенты искажений  $K_{z,x,y}$  определяются через параметр n/m по каждой координатной оси

независимо друг от друга, но в зависимости от положения их ортоцентра –  $O_1$  на плоскости треугольника следов  $-\Delta ZXY$  (рис.1).

Таким образом, в настоящем изложении использование предложенного здесь параметра – "высотная пропорция" позволяет представить материал об ортогональной аксонометрии в достаточно наглядной и компактной форме, что облегчает его освоение с целью дальнейшего его практического использования.

### **Литература**

1. Чалый А.Т. Курс начертательной геометрии. – М.-К.: МАШГИЗ, 1952. – 279 с.
2. Колотов С. М. Начертательная геометрия. – К.: "Вища школа", 1975. – 261 с.
3. Виноградов Н.Н. Начертательная геометрия. – Минск.: "Вышэйшая школа", 1977. – 368 с.
4. Фролов С. А. Начертательная геометрия. – М.: "МАШИНОСТРОЕНИЕ", 1978. – 240 с.
5. Михайленко В.Є., Євстіфеєв М.Ф., Ковальов С.М. Нарисна геометрія. – К.: "ВИЩА ШКОЛА", 2004. – 300 с.
6. Нікулін О. В. Геометрія. Поглиблений курс. – К.: "ПЕРУН", 1999. – 349 с.
7. Жолдак М. І., Грохольська А. В., Жильцов О. Б. Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики). – К.: МАУП, 2004. – 456 с.