

Педагогические науки

УДК 372.851.4

**Абдуллаева Гонча Зульфигаровна**

*доцент кафедры «Математика и методика ее преподавания»*

*Бакинский государственный университет*

**Abdullaeva Goncha**

*Associate Professor of the Department of*

*"Mathematics and Methods of Teaching"*

*Baku State University*

**НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ  
ИСКУССТВЕННЫМИ СПОСОБАМИ  
NON-STANDARD METHODS FOR SOLVING EQUATIONS BY  
ARTIFICIAL MEANS**

*Аннотация.* В данной работе, помимо нестандартных методов решений уравнений с использованием свойств функции (монотонности, ограниченности, периодичности, четности и нечетности, а также ОДЗ функции) существуют и другие дополнительные искусственные методы решения уравнений:

- умножение уравнения на функцию;
- угадывание корня уравнения;
- использование симметричности уравнения;
- исследование уравнения на промежутках действительной оси.

**Ключевые слова:** метод, уравнение, симметричность, корень и т. д.

**Summary.** In this paper, in addition to non-standard methods for solving equations using the properties of a function (monotonicity, boundedness, periodicity, evenness and oddness, as well as the LDU function), there are other additional artificial methods for solving equations:

- *multiplication of an equation by a function;*
- *guessing the root of the equation;*
- *use of symmetry of the equation;*
- *research of the equation on intervals of the real axis.*

**Key words:** *method, function, thinking, innovation, etc.*

**Постановка проблемы.** Некоторые уравнения в результате преобразований могут быть сведены к стандартному виду, для которых существует определенный алгоритм решения.

Для решения этой проблемы используются дополнительные искусственные способы решений уравнений.

**Актуальность проблемы.** При решении сложных задач по математике используются разнообразные нестандартные методы, большинство из которых трудно поддаются классификации. Такие методы ориентированы на решение относительно узкого круга задач, однако их знания и умения пользоваться ими необходимы для успешного решения задач повышенной сложности.

Приведены задачи, решения которых состоит в применении искусственных методов решения.

**Цели и задачи метода.** Целью данной работы является познакомить школьников с различными, основанными на материале программы общеобразовательной средней школы, методами решения, проиллюстрировать использование усвоенных школьных знаний и привить навыки употреблять нестандартные методы рассуждений при решении задач.

### **Умножение уравнения на функцию**

Иногда решение алгебраического уравнения существенно облегчается, если умножить обе его части на некоторую функцию – многочлен от неизвестной. При этом возможно появление лишних корней

– корней многочлена, на который умножали уравнение. Поэтому надо либо умножать на многочлен, не имеющий корней, и получить равносильное уравнение, либо умножать на многочлен, имеющий корни, и тогда каждый из таких корней надо подставить в исходное уравнение и установить, является ли это число его корнем.

**Пример 1.** Решить уравнение:

$$x^8 - x^6 + x^4 - x^2 + 1 = 0. \quad (1)$$

**Решение.** Умножив обе части уравнения (1) на многочлен  $x^2 + 1$ , не имеющий корней, получим уравнение

$$(x^2 + 1)(x^8 - x^6 + x^4 - x^2 + 1) = 0, \quad (2)$$

равносильное данному уравнению (1). Уравнение (2) запишем в виде:

$$x^{10} + 1 = 0. \quad (3)$$

Ясно, что уравнение (3) не имеет действительных корней, поэтому и уравнение (1) также их не имеет.

**Ответ:**  $\emptyset$ .

**Пример 2.** Решить уравнение

$$6x^3 - x^2 - 20x + 12 = 0. \quad (4)$$

**Решение.** Умножим обе части данного уравнения на многочлен  $x + 1/2$ , получим уравнение:

$$6x^4 + 2x^3 - \frac{41}{2}x^2 + 2x + 6 = 0, \quad (5)$$

являющееся следствием уравнения (4), так как уравнение (5) имеет корень  $x = -1/2$ , не являющийся корнем уравнения (4).

Уравнение (5) есть симметрическое уравнение четвертой степени. Поскольку  $x = 0$  не является корнем уравнения (5), то, разделив обе части уравнения на  $2x^2$  и перегруппировав его члены, получим уравнение

$$3\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(x + \frac{1}{x}\right) - \frac{41}{4} = 0 \quad (6)$$

равносильное уравнению (5). Обозначим  $y = x + \frac{1}{x}$  и перепишем уравнение (6) в виде:

$$3y^2 + y - \frac{65}{4} = 0 \quad (7)$$

Уравнение (7) имеет два корня:  $y_1 = -\frac{5}{2}$  и  $y_2 = \frac{13}{6}$ , поэтому уравнение (6) равносильно совокупности уравнений:

$$x + \frac{1}{x} = \frac{13}{6} \quad \text{и} \quad x + \frac{1}{x} = -\frac{5}{2}.$$

Решим каждое из этих уравнений и найдем четыре корня уравнения (6), а тем самым и уравнения (5):

$$x_1 = \frac{2}{3}, \quad x_2 = \frac{3}{2}, \quad x_3 = -2, \quad x_4 = -\frac{1}{2}.$$

Так как корень  $x_4 = -\frac{1}{2}$  является посторонним для уравнения (4), то отсюда получаем, что уравнение (4) имеет три корня:  $x_1, x_2, x_3$ .

**Ответ:**  $\left\{\frac{2}{3}; \frac{3}{2}; -2\right\}$ .

### Угадывание корня уравнения

Иногда, при решении уравнений, сам внешний вид уравнения подсказывает нам, какое число является корнем уравнения.

**Пример 1.** Решить уравнение:

$$x^3 + 3x - 36 = 12^3 \quad (1)$$

**Решение.** Уравнение (1) перепишем в виде:

$$x^3 + 3x - 12^3 - 12 \cdot 3 = 0 \quad (2)$$

Из внешнего вида уравнения (2) понятно, что  $x = 12$  является одним из корней данного уравнения, для нахождения же остальных корней, преобразуем левую часть уравнения (2) в виде:

$$\begin{aligned}x^3 + 3x - (12^3 + 3 \cdot 12) &= (x^3 - 12^3) + 3(x - 12) = (x - 12)(x^2 + 12x + 12^2 + 3) = \\ &= (x - 12)(x^2 + 12x + 147).\end{aligned}$$

Многочлен  $(x^2 + 12x + 147)$  не имеет корней, следовательно единственным корнем данного уравнения является  $x = 12$ .

**Ответ:** {12}.

**Пример 2.** Решить уравнение:

$$\begin{aligned}x(x+1) + (x+1)(x+2) + (x+2)(x+3) + (x+3)(x+4) + (x+4)(x+5) + \\ + (x+5)(x+6) + (x+6)(x+7) + (x+7)(x+8) + (x+8)(x+9) + (x+9)(x+10) = \\ = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 7 + 7 \cdot 8 + 8 \cdot 9 + 9 \cdot 10.\end{aligned}$$

**Решение.** Из самого вида уравнения (3) следует, что  $x_1 = 0$  и  $x_2 = -10$  являются решениями этого уравнения. Раскрыв скобки уравнения (3), получим неполное квадратное уравнение.

Отсюда следует, что уравнение (3) может иметь не более двух корней, это и есть найденные два корня  $x_1 = 0$  и  $x_2 = -10$

**Ответ:** {-10;0}.

**Использование симметричности уравнения.**

Иногда во внешнем виде уравнения мы можем заметить некоторую его симметричность, благодаря чему можем найти способ решения этого уравнения.

**Пример 1.** Решить уравнение

$$\frac{(x^2 - x + 1)^3}{(5 - \sqrt{5} + 1)^3} = \frac{x^2(x-1)^2}{5(\sqrt{5} - 1)^2} \quad (1)$$

**Решение.** Внешний вид уравнения (1) говорит о том, что одним из корней уравнения является  $x_1 = \sqrt{5}$ . Остальные же корни этого уравнения (1) найти не так то легко. Для этого перепишем (1) в виде, учитывая, что

$$x(x-1) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4},$$

получим

$$\frac{\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right]^3}{(5 - \sqrt{5} + 1)^3} = \frac{\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right]^2}{5(\sqrt{5} - 1)^2}. \quad (2)$$

Действительно, если  $x_0$  — является корнем уравнения (5), то и  $x_1 = 1 - x_0$  также корень уравнения (2), поскольку

$$\left(x_0 - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(x_1 - \frac{1}{2}\right)^2. \quad (3)$$

Далее покажем, что если  $x_1, x_1 \neq 0, x_1 \neq 1$  является корнем уравнения (1), то  $x_2 = 1/x_1$  также является корнем этого уравнения.

Действительно, т. к.

$$\frac{(x_2^2 - x_2 + 1)^3}{x_2^2(x_2 - 1)^2} = \frac{\left(\frac{1}{x_1^2} - \frac{1}{x_1} + 1\right)^3}{\frac{1}{x_1^2}\left(\frac{1}{x_1} - 1\right)^2} = \frac{(1 - x_1 + x_1^2)^3}{x_1^6 \frac{1}{x_1^4}(1 - x_1)^2} = \frac{(x_1^2 - x_1 + 1)^3}{x_1^2(x_1 - 1)^2}$$

Получим, что и  $x_2 = 1/x_1$  также есть корень данного уравнения (1).

Итак, если  $x_1, x_1 \neq 0, x_1 \neq 1$ , — корень уравнения (1), то это уравнение имеет еще корни:

$$\frac{1}{x_1}, 1 - x, \frac{1}{1 - x_1}, \frac{1}{1 - \frac{1}{x_1}}$$

т. е. уравнение (1) имеет корни

$$x_1 = \sqrt{5}, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad x_3 = 1 - \sqrt{5}, \quad x_4 = \frac{1}{1-\sqrt{5}}, \quad x_5 = 1 - \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad x_6 = \frac{1}{1-\frac{1}{\sqrt{5}}}$$

Т. к. уравнение (1) есть алгебраическое уравнение шестой степени, то оно имеет не более шести корней.

**Ответ:**  $\left\{ \sqrt{5}; \frac{1}{\sqrt{5}}; 1 - \sqrt{5}; \frac{1}{1 - \sqrt{5}}; 1 - \frac{1}{\sqrt{5}}; \frac{1}{1 - \frac{1}{\sqrt{5}}} \right\}$ .

### Исследование уравнения на промежутках действительной оси.

Этот способ состоит в нахождении уравнения исследованием его на разных числовых промежутках.

**Пример 1.** Решить уравнение

$$2x^9 - x^5 + x - 2 = 0. \quad (1)$$

**Решение.** Уравнение (1) перепишем уравнение в виде

$$2(x^9 - 1) - x(x^4 - 1) = 0 \quad (1')$$

Используя формулу разности

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}),$$

перепишем (1) в виде

$$(x - 1)(2x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 2) = 0. \quad (2)$$

Из уравнения (2) следует, что одним из корней данного уравнения есть  $x = 1$ . Теперь докажем, что уравнение

$$2x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 2 = 0 \quad (3)$$

решений не имеет.

Всю числовую ось разобьем на промежутки:

$$(-\infty; -1], \quad (-1, 0] \in [0; +\infty)$$

Рассмотрим промежуток  $[0; +\infty)$ . На этом промежутке для любого  $x$  имеем, что левая часть уравнения (3) положительна, поэтому уравнение решений не имеет.

Так как

$$\begin{aligned} & 2x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 2 = \\ & = 2x^8 + 2x^6(x+1) + 2x^4(x+1) + x^2(x+1) + (x+1) + (1-x^4), \end{aligned}$$

то для любого  $x$  из промежутка  $(-1, 0]$  этот многочлен положителен.

Отсюда следует, что и на этом промежутке  $(-1, 0]$  уравнение (3) также не имеет решений.

Далее, поскольку

$$\begin{aligned} & 2x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 2 = \\ & = 2x^7(x+1) + 2x^5(x+1) + x^3(x+1) + x(x+1) + 2, \end{aligned}$$

то для любого  $x$  из промежутка  $(-\infty; -1]$  этот многочлен положителен, т. е. и на этом промежутке уравнение (3) не имеет решений.

Следовательно уравнение (3) имеет единственное решение  $x = 1$ .

**Ответ:**  $\{1\}$ .

В итоге можно сказать, что в процессе исследования цель данной работы достигнута, полностью решены поставленные задачи, рассмотрены и опробованы дополнительные (искусственные) методы решения уравнений.

### Литература

1. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств». – 1992.
2. Далингер В.А. «Нестандартные уравнения и методы их решения», Омск. – 1995.



3. Голубев В.И. «Решение сложных и нестандартных задач по математике». – 2007.
4. Потапов М.К. «Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения» М.: «Дрофа Олехник». – 2002.
5. Супрун В.П. «Нестандартные методы решения задач по математике» Минск. – 2003.